

НОВЫЕ ТАКСОНЫ

УДК 582.682.6

Г.А. Лазьков

G.A. Lazkov

НОВЫЙ ВИД РОДА *CORYDALIS* (FUMARIACEAE) ИЗ КИРГИЗИИ

A NEW SPECIES OF THE GENUS *CORYDALIS* (FUMARIACEAE) FROM KYRGYZSTAN

Аннотация. Описан новый вид *Corydalis subverticillata* Lazkov. Приводится морфологическое описание вида и его отличие от близкого вида *C. bosbutooensis* Lazkov.

Ключевые слова: Fumariaceae, *Corydalis*, новый вид, Кыргызстан.

Summary. A new species *Corydalis subverticillata* Lazkov from Kyrgyzstan is described. A morphological description is given. Differences from related species *C. bosbutooensis* Lazkov are discussed.

Key words: Fumariaceae, *Corydalis*, new species, Kyrgyzstan.

В 2006 году мною был описан с гор Бозбу-Тоо (южные отроги Чаткальского хребта) скальный вид *Corydalis* DC. из подсекции *Flabellatae* Fedde секции *Strictae* (Fedde) Wendelbo – *C. bosbutooensis* Lazkov. Данная подсекция довольно богата видами, часть которых являются узкоэндемичными (Михайлова, 1982). Ранее с Чаткальского хр. виды этой секции не были известны. В 2010 году при посещении Сары-Челекского заповедника был собран еще один вид *Corydalis*, первоначально принятый мною за *C. bosbutooensis*. При более внимательном рассмотрении было найдено несколько отличий вновь собранных образцов от *C. bosbutooensis*. Оказалось, что обнаруженные растения являются новым для науки видом, который ниже описывается.

***Corydalis subverticillata* Lazkov sp. nov.** – Planta perennis, caudice lignoso. Radix crassus, verticalis. Caudex multiceps, residuis fuscenti-griseis petiolorum et caulorum floriferorum emortuorum vestitus. Folia tenuia, glaucescentia; basalia et media bipinnatisecta, lamina ambitu oblonga, 3–7 cm lg., 1.5–2 cm lt., petiolata, petiolis 3–7 cm lg.; superiora pinnata vel ternata, lamina ambitu ovata vel triangulata, 1–3 cm lg., 1–1.5 cm lt., petiolis brevi-

bus. Caules 30–55 cm alti, numerosi, sectione rotundati, sub foliis vix angulati, a medio vel in parte superiore ramosi, ramis vix deflexis. Inflorescentia racemoso-paniculata. Flores ad apices caulorum ramulorumque subverticillati. Bractee 2–4 mm lg., 0.7–1 mm lt., lanceolatae, herbaceae, albopaleaceo-marginati. Pedicelli 6–20 mm lg., tenuii, plus minusve reflexi. Sepala 3–4 mm lg., 1–1.5 mm lt., late ovato-lanceolata, paleacea, basi ciliata, violacea. Corolla flava, 15–16 mm lg., calcar 4–6 mm lg. Capsula immatura, sublanceolata, 12–13 mm lg., 2.0–2.5 mm lt. Stylus persistens, 4–5 mm lg. Semina ignota (fig. 1, 2).

Typus: «Jugum Czatkalicum, ripa sinistra fluvii Khoja-Ata, in viciniis pagi Arkit, in saxosis, c. 1250 m. s. m., 10 VI 2010, G.A. Lazkov, M.R. Ganybaeva» (LE, isotypi: ALTB, FRU, MW, UPS).

Affinitas. A *C. bosbutooensis* Lazkov capsulis angustioribus et inflorescentiis angustioribus multifloris differt.

Растение многолетнее, с одревесневающим каудексом. Корень толстый, стержневой. Каудекс многоглавый, покрыт буровато-серыми остатками листовых черешков и цветоносных стеблей. Листья тонкие, сизоватые, голые; нижние

Биолого-почвенный институт НАН Кыргызстана, Лаборатория флоры (FRU), пр. Чуй, 265; 720071, Бишкек, Кыргызстан; e-mail: glazkov1963@mail.ru

Laboratory of Flora, Institute for Biology & Pedology, National Academy of Sciences of Kyrgyzstan, Tchui Avenue 265; 720071, Bishkek, Kyrgyzstan

Поступило в редакцию 07.07.2010 г.

Submitted 07.07.2010



Рис. *Corydalis subverticillata* Lazkov: а – общий вид, б – соцветие.

и средние дважды перисторассеченные, с продолговато-яйцевидной в очертании пластинкой 3–7 см дл., 1.5–2 см шир., на черешках 3–7 см дл., верхние просто-перистые или тройчатые, с яйцевидной или треугольной в очертании пластинкой 3 см дл., 1–1.5 см шир., на коротких черешках. Стебли 30–55 см выс., многочисленные, цилиндрические, под листьями слабо гранистые, простые или в верхней части ветвящиеся, со слегка отогнутыми ветвями, голые. Соцветия кистевидно-метельчатые. Цветки почти мутовчато скучены на концах стеблей и боковых веточек. Прицветники 2–4 мм дл., 0.7–1 мм шир., ланцетные, травянистые, белопленчато окаймленные. Цветоножки 6–20 мм дл., тонкие, более или менее отогнутые. Чашелистики 3–4 мм дл., 1–1.5 мм шир., яйцевидно-ланцетные, пленчатые, в основании реснитчатые, фиолетово окрашенные.

Венчик желтый, 15–16 мм дл., шпорец 4–6 мм дл. Коробочка (незрелая) почти ланцетная, 12–13 мм дл., 2–2.5 мм шир. Столбик неоппадающий, 4–5 мм дл. Семена неизвестны (рис. а, б).

Тип: «Чаткальский хребет, близ села Аркит, левый берег реки Ходжа-Ата, скалы, около 1250 м над ур. м., 10 VI 2010, Г.А. Лазьков, М.Р. Ганыбаева» (LE, isotypi: ALTB, FRU, MW, UPS).

Родство. От *C. bosbutoensis* Lazkov отличается более узкими коробочками, более узким и многоцветковым соцветием.

Благодарности. Автор благодарен А.Н. Сеникову за правку латинского описания и проекту «*Conserving Eden: participatory forest management in the Tien Shan*» Дарвиновской Инициативы (The Darwin Initiative) за возможность посетить Сары-Челекский заповедник.

ЛИТЕРАТУРА

- Лазьков Г.А. Новый вид рода *Corydalis* (Fumariaceae) // Бот. журн., 2006. – Т. 91, № 6. – С. 954–955.
 Михайлова М.А. О некоторых среднеазиатских видах *Corydalis* Vent. (Fumariaceae) // Новости сист. высш. раст. – Л., 1982. – Т. 19. – С. 81–98.